

bois et nos forêts depuis Juillet jusqu'en Novembre, passent sous les feuilles sèches les hivers peu rigoureux; je l'ai trouvée, le 10 Janvier 1910, dans la forêt de Monnaye (Mayenn).

Le *Xiphidion dorsale* et le *Grillus burdigalensis* n'avaient pas encore été signalés dans nos régions.

Additions au Catalogue des plantes adventices observées aux environs d'Alençon et dans le département de l'Orne.

Par M. l'Abbé LETACQ

Depuis la publication de ce mémoire, j'ai reçu de mes amis MM. Husnot, de Cahan et E. Lecœur, de Vimoutiers, quelques indications que je m'empresse de transcrire ici ; j'y ajoute mes propres observations.

Aquilegia vulgaris L. — On en trouve de toutes nuances et de toutes formes à Feings sur les ruines de l'abbaye du Val-Dieu, restes des anciennes cultures des Chartreux !

Saponaria officinalis L. — Ca et là sur les bords des rivières dans les vallées de la Touque et de la Vie ; il est probable que la Saponaire y fut introduite par les Romains, qui avaient fondé de nombreux établissements dans cette contrée.

Sedum dasyphyllum L. — Spontané dans les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, etc. — Sur des vieux murs à Sées près des Promenades et à Assé-le-Boisne (Sarthe), vis-à-vis de l'église !

Matricaria discoidea D C. — Près la gare de Sainte-Gauburge (E. Lecœur).

Centaurea melitensis L. — Originaire du Midi de la France. — Plaine de Montsort à Alençon, dans une luzernière !

☞ *Cyclamen europæum* L. — Spontané dans les Alpes et les Pyrénées, très répandu dans certaines contrées de l'Italie. — J'en ai vu, dans les bois de Mesnil-Gault à la Chapelle-près-Sées, un pied, qui a subsisté plusieurs années.

