

## Deux plantes à détruire pour préserver de maladies les légumes de nos jardins.

---

Les salades, laitues ou chicorées, parfois même les artichauts, se couvrent souvent de moisissures blanches à la face inférieure des feuilles. C'est une maladie connue sous le nom vulgaire de *meunier*, causée par un champignon le *Mildiou des salades* ou *Pero-nospora gangliiformis*. Ces taches s'étendent rapidement et ne tardent pas à épuiser les feuilles qui jaunissent, se dessèchent et meurent. Or dans ces parties desséchées se trouvent les spores ou semences de réserve d'un jaune brun.

Le sulfatage et le soufrage des pieds contaminés seraient les meilleurs remèdes à employer pour combattre les invasions du *meunier*, mais il n'y faut pas songer en raison de l'emploi des légumes dans l'alimentation ; on devra donc recourir à d'autres procédés.

Observons d'abord que la maladie ne résiste pas aux froids de l'hiver, qui sont les meilleurs auxiliaires des Jardiniers. Mais durant la belle saison, sitôt que la maladie est constatée dans un carré de salade, on doit enlever tous les pieds atteints et les brûler. Il est même prudent de n'y pas réitérer la culture l'année suivante.

Mais il y a un remède préventif plus efficace que tous ceux-là. Il est un fait démontré par des années d'observations assidues, c'est que dans les neuf dixièmes des cas, la *Lampsane commune* (*Lapsana communis* L.) est le foyer du *meunier* des salades. Le moyen le plus simple est donc de ne pas la tolérer dans les jardins ou à leur voisinage, qu'elle soit

contaminée ou non. On reconnaît le meunier sur cette plante à l'efflorescence blanche, qui couvre la face inférieure des feuilles.

La Lapsane commune, très répandue dans notre pays, croît dans les jardins, les champs, les haies et aux abords des habitations ; elle est désignée dans quelques localités sous les noms vulgaires de *Poule-grasse*, *Poulette-grasse*, *Oreille-de-Veau*. Elle appartient à la famille des Composées et se reconnaît aux caractères suivants : Tige de 2 à 10 décimètres, dressée, un peu pubescente, feuilles inférieures lyrées, à lobe terminal plus grand arrondi, les supérieures lancéolées, peu ou point dentées rameaux florifères dichotomes, longuement nées sous les capitules, ceux-ci nombreux, petits, dressés, en panicule étalée ; involucre glabre ; fleurs jaunes ; fruits à stries fines ; plante annuelle.

Ce que je viens de dire de la Lapsane commune, je puis le répéter pour une Crucifère non moins répandue dans nos champs et nos jardins, appelée communément *Bourse à pasteur* (*Capsella bursa pastoris* L.). Celle-là est le foyer du *Blanc des Choux* (*Cystopus candidus*), maladie qui couvre aussi de taches blanches non seulement les choux, mais d'autres crucifères, tels que les navets et les radis. Cette moisissure arrête le développement des jeunes plants, empêche la formation de la racine des navets et des radis et rend impropres à l'alimentation les feuilles de choux qu'elle envahit.

Les procédés de destruction que j'ai indiqués pour le *meunier des salades* peuvent servir pour le *Blanc des Choux*, mais là aussi la meilleure méthode est de prévenir la maladie, c'est-à-dire de

