

2° Cormoran (*Phalacrocorax carbo* Lath.); mâle adulte tué aux environs de Sées le 22 mars 1922;

3° Cygne de Bewick (*Cygnus Bewickii* Yarr.); mâle adulte tué à Saint-Denis-sur-Sarthon, au voisinage de l'étang de la Forge, le 18 février 1922;

4° Grue cendrée (*Grus cinerea* Bechsh.), mâle adulte tué à Nocé sur l'Erre, le 27 mars 1922.

Black-Bass. — M. LETACQ signale la capture au mois de juillet, dans la Sarthe, à Alençon, d'un poisson d'origine américaine, la Perche-Truite (*Micropterus salmoides*) connue aux États-Unis et en Europe sous le nom vulgaire de *Black-Bass*, à cause de la couleur vert sombre de la région dorsale. L'exemplaire pris à Alençon mesure 28 cm. de longueur et pèse 270 grammes.

Des alevins de cette espèce ayant été, il y a quelques années, versés dans la Vesonne, affluent de la Sarthe, et dans l'étang de Radon, qui par le ruisseau de la Croix, se déverse dans cette rivière, n'ont pas tardé à prospérer et se sont multipliés dans nos eaux. Leur chair est, dit-on, supérieure en qualité à celle de notre Perche indigène.

Mollusques. — M. LETACQ montre des exemplaires de *Helix obvolula* Mull. et *H. lapicida* L., trouvés sous la mousse au pied des arbres dans la forêt de Bellême, le premier encore inconnu dans l'Orne, le second qu'on regardait comme limité à la zone de nos terrains anciens. Il a aussi observé dans la forêt du Perche le *Limax cinereo-niger* Woölf. déjà reconnu en Andaines et en Ecouves et qui, il y a dix ans, n'avait pas encore été signalé dans l'Ouest de la France.

Apelinus mali Hald. — M. LÉBOUCHER entretient ses collègues des résultats obtenus par l'introduction de ce parasite du Puceron lanigère dans son jardin en